

定期予防接種のスケジュール

※ヒブ（インフルエンザ菌 b 型）および小児用肺炎球菌ワクチンは、接種開始月齢（年齢）によって接種回数異なります。

ヒブ（インフルエンザ菌 b 型）ワクチン

接種開始月（年）齢	接種回数		法律で認められている接種間隔	お勧めする接種間隔	接種可能年齢
生後 2 か月以上 生後 7 か月未満	初回	3 回	27日（医師が必要と認める場合は 20日）以上	27日（医師が必要と認める場合 は20日）から56日まで	生後2か月以上5歳未満
			※1歳未満		
追加	1 回	初回接種の最後の接種後 7 月以上	初回接種の最後の接種後、7 月 から 13 月まで		
		※2 回目または 3 回目の接種が1歳を超える場合は、2 回目または 3 回目の接種 は行わず、最後の接種後 27 日以上の間隔をおいて追加接種をする。			
生後 7 か月以上 1 歳未満	初回	2 回	27日（医師が必要と認める場合は 20日）以上	27日（医師が必要と認める場合 は20日）から56日まで	
			※1歳未満		
追加	1 回	2 回目接種後 7 月以上	初回接種の最後の接種後、7 月 から 13 月まで		
		※2 回目の接種が1歳を超える場合は2回目の接種は行わず、最後の接種 後、27日以上の間隔をおいて追加接種をする。			
1 歳以上 5 歳未満			1 回		

小児用肺炎球菌ワクチン

接種開始月（年）齢	接種回数		法律で認められている接種間隔	お勧めする接種間隔	接種可能年齢
生後 2 か月以上 生後 7 か月未満	初回	3 回	27日以上（2歳未満）	27日以上（1歳未満）	生後2か月以上5歳未満
			2回目または3回目の接種が2歳を超える場合は接種しないこと。 また2回目の接種が1歳を超えた場合、3回目の接種はしないこと。 （追加接種は可能）		
追加	1 回	初回接種終了後60日以上あけて 1歳以降。	初回接種終了後60日以上あけて 生後12か月から15か月の間		
生後 7 か月以上 1 歳未満	初回	2 回	27日以上（2歳未満）	27日以上（1歳未満）	
			2回目の接種が2歳を超える場合は接種しないこと。（追加接種は可能）		
追加	1 回	初回接種終了後 60 日以上あけて、1 歳以降			
1 歳以上 2 歳未満	2 回		60 日以上の間隔をおく		
2 歳以上 5 歳未満			1 回		

予防接種の種類	接種回数	法律で認められている接種間隔	お勧めする接種間隔	接種可能年齢	接種をお勧めする年齢	
B型肝炎	3回	27日以上の間隔をおいて2回接種した後、第1回目の接種から139日以上の間隔をおいて3回目を接種		1歳未満	生後2か月以上9か月未満	
ロタウイルス (ロタリックス)	2回	27日以上		生後6週から24週	初回接種：生後2か月以上 14週6日まで	
ロタウイルス (ロタテック)	3回			生後6週から32週		
四種混合 (ジフテリア・破傷風 百日咳・ポリオ)	初回3回	20日以上	20日から56日まで	生後2か月以上7歳半未満	生後2か月以上1歳未満	
	追加1回	初回接種終了後6月以上あける	初回接種終了後、1年から1年半あける	生後2か月以上7歳半未満		
BCG	1回			1歳未満	生後5か月以上8か月未満	
ジフテリア・破傷風 混合 (四種混合2期に該当)	1回			11歳以上13歳未満	11歳以上12歳未満	
麻しん 風しん 混合 (MR)	1期	1回		1歳以上2歳未満		
	2期	1回		<u>小学校入学前の1年間(4月1日～3月31日まで)で、5歳以上7歳未満</u> <u>※5歳になったらすぐに接種できるわけではありません。年長児が対象です。</u>		
水痘(みずぼうそう)	2回	3月以上	6月から12月まで	1歳以上3歳未満	生後12か月から15か月までに1回目を接種	
日本脳炎	1期	初回2回	6日以上	6日から28日まで	生後6か月以上7歳半未満	3歳以上4歳未満
		追加1回	初回接種終了後6月以上あける	初回接種からおおむね1年後		4歳以上5歳未満
	2期	1回			9歳以上13歳未満	9歳以上10歳未満

※用語の解釈にご注意ください。

「〇歳未満」：〇歳の誕生日の前日まで