

定期予防接種のスケジュール①

小児用肺炎球菌ワクチン

※小児用肺炎球菌ワクチンは、接種開始月齢（年齢）によって接種回数が異なります。

接種開始月（年）齢	接種回数		法律で認められている 接種間隔	お勧めする接種間隔	接種可能年齢
生後2か月以上 生後7か月未満	初回	3回	27日以上（2歳未満）	27日以上（1歳未満）	生後2か月以上 5歳未満
			2回目または3回目の接種が2歳を超える場合は接種しないこと。 また2回目の接種が1歳を超えた場合、3回目の接種はしないこと。 （追加接種は可能）		
追加	1回	初回接種終了後60日以上 あけて1歳以降。	初回接種終了後60日以上あけて 生後12か月から15か月の間		
生後7か月以上 1歳未満	初回	2回	27日以上（2歳未満）	27日以上（1歳未満）	
			2回目の接種が2歳を超える場合は接種しないこと。 （追加接種は可能）		
追加	1回	初回接種終了後60日以上あけて、1歳以降			
1歳以上2歳未満	2回		60日以上の間隔をおく		
2歳以上5歳未満			1回		

五種混合ワクチン（ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ・ヒブ）

標準的な接種期間	接種回数	法律で認め られている 接種間隔	お勧めする 接種間隔	接種可能年齢
生後2か月から 生後7か月まで	初回3回	20日以上	20日から56日まで	生後2か月以上 7歳半未満
-	追加1回	初回接種終了後 6月以上あける	初回接種終了後、 半年から1年半あける	

※用語の解釈にご注意ください。

「〇歳未満」：〇歳の誕生日の前日まで

定期予防接種のスケジュール②

予防接種の種類		接種回数	法律で認められている接種間隔	お勧めする接種間隔	接種可能年齢	接種をお勧めする年齢
B型肝炎		3回	27日以上の間隔をおいて2回接種した後、第1回目の接種から139日以上の間隔をおいて3回目を接種		1歳未満	生後2か月以上9か月未満
ロタウイルス (ロタリックス)		2回	27日以上		生後6週から24週	初回接種：生後2か月以上 14週6日まで
ロタウイルス (ロタテック)		3回			生後6週から32週	
BCG		1回			1歳未満	生後5か月以上8か月未満
ジフテリア・破傷風 混合 (五種混合2期に該当)		1回			11歳以上13歳未満	11歳以上12歳未満
麻しん 風しん 混合 (MR)	1期	1回			1歳以上2歳未満	
	2期	1回			<u>小学校入学前の1年間(4月1日～3月31日まで)で、5歳以上7歳未満</u> ※5歳になったらすぐに接種できるわけではありません。 <u>年長児が対象です。</u>	
水痘(みずぼうそう)		2回	3年以上	6月から12月まで	1歳以上3歳未満	生後12か月から15か月までに1回目を接種
日本脳炎	1期	初回2回	6日以上	6日から28日まで	生後6か月以上7歳半未満	3歳以上4歳未満
		追加1回	初回接種終了後6月以上あける	初回接種からおおむね1年後		4歳以上5歳未満
	2期	1回			9歳以上13歳未満	9歳以上10歳未満

※用語の解釈にご注意ください。

「〇歳未満」：〇歳の誕生日の前日まで